

Test für Blasenentleerungsstörungen infolge gutartiger Prostataerkrankungen (IPSS)

Hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war?

Telefon: +49 (40) 2203055

Telefax: +49 (40) 2208258

○Nie

OSeltener als in einem von fünf Fällen.

Seltener als in der Hälfte aller Fälle.

On etwa der Hälfte aller Fälle.

OHäufiger als in der Hälfte aller Fälle

OFast immer oder immer.

IPPS-Test zum Download

Sie können den IPPS-Test auch mit angezeigter Punktevergabe für die sieben Fragen durchführen. Die Bewertung erfolgt in Form eines Punkteschemas von 0-35 Punkten.

Eine Indikation für eine Therapie wird im allgemeinen bei einem **IPSS-Wert über 7** gesehen.

Den IPPS-Test können Sie hier herunterladen, ausdrucken und durchführen.

								Sell
nternationaler F	Prostata l	Sympton	s Score (I	PPS)				
Name, Vorquese								
Allresse								
Oeturosterum								
lund 50 % aller Warner on Ultream unserer Cessunibel Iroid Brier Prostatubenchare Internationaler Province 5	rise machen (lund kirosen S	e Prostata Bench pareferens. Mit i ie Bench-And ain	tuerden Bei d lein fran angeli e anchtige mille	on His Jahragam obsesser. Yand his sabellung gather	und ex sugar 90 %. even lise such auf en	For use tol deep fluible Art und 10	Stand genus, uno e esse un Sté uber de Side enhaben Sie from Statun alle I Woollen aufo seo und vergeschen Sie die Woole
Alle Regulor beziehen soch auf die Netten d Westen	nemah	solumer an or erech von Nari Fallen	softener pt. or der regifie pter Fate	ungeführ in der Halfe aller Falle	a malor at- air rights after 7 ate	fed incorr	Outurn	
1. We off total Se day Certain, dans five Blace track dem Wasserlassen tickt para entirent war?	٠	,	2	,				
2 We of number Se methods on 2 Stander in selectes Mid Wasser langer?	*	10	2	1	*	6.		
3. We of muster Se- ten Wyserfasser	0	1	2	3	4	5		